

Po Jums atliktos operacijos, dar keletą savaičių gali būti kraujingų išskyrių iš gimdos kaklelio (vyksta normalus operacinės žaizdos gijimas), todėl rekomenduotina naudoti ir dažnai keisti higieninius įklotus. Nenaudokite tamponų į makštį.

Po Jums atliktos operacijos, keletą dienų galite jausti maudimą, diskomfortą pilvo apačioje. Šiems simptomams malšinti tinka įprastiniai nuskausminamieji vaistiniai preparatai, kuriuos rekomenduos gydytojas. Ribokite fizinį krūvį.

Kiekvieną dieną apsiplaukite išorinius lytinius organus. Tačiau 4 sav. po operacijos nesimaudykite karštoje vonioje, baseine, gamtiniuose vandens telkiniuose, nesilankykite pirtyse.

Dėl infekcijos rizikos rekomenduojama 4 sav. neturėti lytinių santykių. Vėliau dar apie 1 mėn. lytinių santykių metu naudokite prezervatyvus.

Praėjus 2 sav. po operacijos rekomenduojama užsiregistruoti ir atvykti antrinei konsultacijai pas operaciją atlikusį gydytoją (galima registracija ir nuotoliniu būdu).

Svarbu! Esant neaiškumui dėl pakitusių išskyrių iš makšties, kraujavimui, pilvo skausmui, karščiavimui – kreipkitės į savo šeimos gydytoją arba susisieki­te ir atvykite pas Jus operavusį gydytoją.

**Esant bet kokiems klausimams, neaiškumams skambinkite tel. nr.:**

<b>1811</b>	Klientų aptarnavimo centras
<b>+370 5 244 1188</b>	
<b>+370 41 595396</b>	Šiaulių Affidea klinika (tik dienos chirurgijos klausimais)
<b>+370 37 216188</b>	Kauno Affidea klinika (tik dienos chirurgijos klausimais)

Būkite sveika!